

INSPECTORATUL ȘCOLAR
JUDEȚEAN IAȘI

CONCURSUL NAȚIONAL DE MATEMATICĂ APLICATĂ "ADOLF HAIMOVICI"

ETAPA JUDEȚEANĂ
19 martie 2016




FACULTATEA
CONSTRUCȚII DE MAȘINI
ȘI MANAGEMENT INDUSTRIAL

Profil real, specializarea științele naturii

CLASA A IX-A

- Dorin are o grădină care trebuie săpată. El îi tocmește pe Ion și pe Vasile, doi muncitori la fel de harnici. Ion muncește 9 ore, iar Vasile 15 ore. Pentru munca sa, Vasile primește cu 90 lei mai mult decât Ion.
 - Ce sumă primește fiecare dintre cei doi muncitori?
 - Suprafața săpată de Ion în 9 ore are forma unui pătrat cu latura de 9 metri. De cât timp are nevoie Ion pentru a săpa o suprafață având forma unui pătrat cu latura de 3 metri?
- Pe latura CD a dreptunghiului $ABCD$ se consideră punctele P și Q astfel încât $DP = PQ = QC$. Definem punctele R și S prin $2\overline{AR} = 3\overline{AP}$, respectiv $\overline{AS} = \overline{AB} + \overline{AR}$.
 - Demonstrați că punctele A , C și S sunt coliniare.
 - Arătați că Q este centrul de greutate al triunghiului ARS .
- Se consideră numerele reale a , b și c astfel încât $a \leq b \leq c$, $a + b + c = 1$ și $a^2 + b^2 + c^2 = 1$.
 - Demonstrați că $b \in \left[0, \frac{2}{3}\right]$.
 - Găsiți trei numere reale, distincte două câte două, având proprietățile din enunț.
- Pentru fiecare număr natural m , se consideră mulțimea $A_m = \{x \in \mathbb{Z} \mid |2x-1| + |3x-1| = m\}$.
 - Determinați A_0 .
 - Demonstrați că, oricare ar fi numărul natural m , mulțimea A_m are cel mult un element.
 - Dacă n este un număr întreg oarecare, arătați că există un număr natural m pentru care $n \in A_m$.

Notă. Timp de lucru: 4 ore. Fiecare problemă este notată cu punctaje de la 0 la 7.



INSPECTORATUL ȘCOLAR
JUDEȚEAN IAȘI

CONCURSUL NAȚIONAL
DE MATEMATICĂ APLICATĂ
"ADOLF HAIMOVICI"

ETAPA JUDEȚEANĂ
19 martie 2016




FACULTATEA
CONSTRUCȚII DE MAȘINI
ȘI MANAGEMENT INDUSTRIAL

Profil real, specializarea științele naturii

CLASA A X-A

- Demonstrați că $(29\sqrt{2} + 41) \cdot (29\sqrt{2} - 41) = 1$
 - Calculați $(1 + \sqrt{2})^2$; $(1 + \sqrt{2})^3$ și $(1 + \sqrt{2})^5$
 - Determinați $n \in \mathbb{N}^*$, $n \geq 2$ pentru care are loc egalitatea $\sqrt[n]{29\sqrt{2} + 41} - \sqrt[n]{29\sqrt{2} - 41} = 2$.
- Rezolvați în \mathbb{R} ecuația $\log_2(x^2 + 4) - \log_2 x = 4x - x^2 - 2$.
- Determinați mulțimea $M = \left\{ (x, y) \in \mathcal{P} \mid \operatorname{Re} \left(\frac{z-2}{z-4i} \right) = 0 \right\}$.
Reprezentați geometric mulțimea M . (unde $z = x + yi$, \mathcal{P} - planul complex)
- La un turneu de fotbal în sală participă 15 echipe, fiecare jucând o singură dată cu fiecare dintre celelalte echipe. Pentru victorie se acordă echipei câștigătoare 3 puncte, pentru meci egal câte 2 puncte pentru fiecare echipă, iar pentru înfrângere 1 punct. În clasamentul întocmit la sfârșitul turneului nu există echipe cu același număr de puncte, iar echipa clasată pe ultimul loc are 21 puncte.
 - Care este numărul de meciuri disputate în cadrul turneului ?
 - Care este numărul total de puncte acordate la toate meciurile ?
 - Să se demonstreze că prima clasată a făcut cel puțin un meci egal.

Notă. Timp de lucru: 4 ore. Fiecare problemă este notată cu punctaje de la 0 la 7.



INSPECTORATUL ȘCOLAR
JUDEȚEAN IAȘI

CONCURSUL NAȚIONAL DE MATEMATICĂ APLICATĂ "ADOLF HAIMOVICI"

ETAPA JUDEȚEANĂ
19 martie 2016



FACULTATEA
CONSTRUCȚII DE MAȘINI
ȘI MANAGEMENT INDUSTRIAL

Profil real, specializarea științele naturii


CLASA A XI-A

1. În fiecare din cele 9 căsuțe ale unei table de latură 3 este scrisă cifra 0.
Se alege un pătrat de latură 2 și se mărește numărul scris în fiecare din
cele 4 căsuțe cu o unitate.
Folosind repetat acest procedeu putem obține configurația alăturată ?
(Suma tuturor numerelor din configurație nu este multiplu de 4).

4	9	6
7	24	11
6	12	8

2. Fie matricele $A = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ și $X(a) = I_2 + aA; a \in \mathbb{R}$. Demonstrați că $X(a)$ este inversabilă
dacă și numai dacă $a \neq -1$ și calculați $X^{-1}(1) \cdot X(2) \cdot X^{-1}(3) \cdot X(4) \cdot \dots \cdot X^{-1}(2013) \cdot X(2014)$.
3. Fie A, B, C puncte necoliniare în plan având coordonate întregi.
Să se arate că aria ΔABC este mai mare sau egală cu $\frac{1}{2}$.
4. a) Precizați dacă următoarele afirmații sunt adevărate sau false:
i) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = 1$; ii) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x + \pi)}{x + \pi} = 1$. Justificare.
b) Să se calculeze raportul $\frac{a}{b}$ știind că $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg}(ax) - \sin(ax)}{\operatorname{tg}(bx) - \sin(bx)} = 2016^3$.

Notă. Timp de lucru: 4 ore. Fiecare problemă este notată cu punctaje de la 0 la 7.



INSPECTORATUL ȘCOLAR
JUDEȚEAN IAȘI

CONCURSUL NAȚIONAL DE MATEMATICĂ APLICATĂ "ADOLF HAIMOVICI"

ETAPA JUDEȚEANĂ
19 martie 2016



FACULTATEA
CONSTRUCȚII DE MAȘINI
ȘI MANAGEMENT INDUSTRIAL

Profil real, specializarea științele naturii

CLASA A XII-A

1. Se consideră mulțimea $G = \left\{ A(k) = \begin{pmatrix} 2^k & 0 & 2^k \\ 0 & 0 & 0 \\ 2^k & 0 & 2^k \end{pmatrix}, k \in \mathbb{Z} \right\}$.

a) Să se arate că pentru orice m, n întregi, are loc: $A(m) \cdot A(n) = A(m+n+1)$

b) Să se demonstreze că (G, \cdot) este un grup abelian, unde " \cdot " reprezintă înmulțirea matricelor;

c) Dacă mulțimea $H \neq \{A(-1)\}$ este un subgrup al grupului (G, \cdot) , să se demonstreze că H are cel puțin 2016 elemente.

2. Considerăm funcțiile $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 + e^x$ și $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $F(x) = \int_0^x f(t) dt$.

a) Arătați că funcția F este bijectivă;

b) Calculați $\int_0^{e-\frac{2}{3}} F^{-1}(x) dx$.

3. Pe mulțimea numerelor reale \mathbb{R} , definim legea de compoziție $x * y = xy + 5x + 5y + 20$. Se admite faptul că $G = (-5, \infty)$ împreună cu legea de compoziție "*" are o structură algebrică de grup.

a) Să se arate că grupurile $(G, *)$ și (\mathbb{R}_+^*, \cdot) sunt izomorfe;

b) Să se calculeze $-2016 * (-2015) * \dots * (-1) * 0 * 1 * \dots * 2015 * 2016$;


c) Se consideră mulțimea $H = \{a^2 - 5, a \in \mathbb{Q}\}$. Să se arate că $(H, *)$ este un subgrup al grupului $(G, *)$.

4. Pentru orice n număr natural nenul, se consideră numerele $I_n = \int \frac{\sin(nx)}{\sin(x)} dx, \forall x \in (0, \pi)$.

a) Să se demonstreze că $I_{n+2} = I_n + \frac{2 \sin(n+1)x}{n+1}, \forall n \in \mathbb{N}^*$;

b) Să se determine funcția $f: (0, \pi) \rightarrow \mathbb{R}$, știind că $f'(x) \cdot \sin x = \sin 5x$ și $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$

Notă. Timp de lucru: 4 ore. Fiecare problemă este notată cu punctaje de la 0 la 7.



INSPECTORATUL ȘCOLAR
JUDEȚEAN IAȘI

CONCURSUL NAȚIONAL DE MATEMATICĂ APLICATĂ "ADOLF HAIMOVICI"

ETAPA JUDEȚEANĂ
19 martie 2016



FACULTATEA
CONSTRUCȚII DE MAȘINI
ȘI MANAGEMENT INDUSTRIAL

Profil real, specializarea științele naturii

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE CLASA A IX-A

1. Dorin are o grădină care trebuie săpată. El îi tocmește pe Ion și pe Vasile, doi muncitori la fel de harnici. Ion muncește 9 ore, iar Vasile 15 ore. Pentru munca sa, Vasile primește cu 90 lei mai mult decât Ion.
- Ce sumă primește fiecare dintre cei doi muncitori?
 - Suprafața săpată de Ion în 9 ore are forma unui pătrat cu latura de 9 metri. De cât timp are nevoie Ion pentru a săpa o suprafață având forma unui pătrat cu latura de 3 metri?

Soluție.

Vasile muncește cu 6 ore în plus față de Ion, prin urmare retribuția pentru o oră de muncă este de $90 : 6 = 15$ lei. 2 puncte
 Ion primește $9 \cdot 15 = 135$ lei, iar Vasile primește $15 \cdot 15 = 225$ lei. 2 puncte
 Un pătrat cu latura de 3 m are aria de nouă ori mai mică decât cea a unui pătrat cu latura de 9 m. Timpul necesar va fi de nouă ori mai mic, deci Ion are nevoie de 1 oră 3 puncte

2. Pe latura CD a dreptunghiului $ABCD$ se consideră punctele P și Q astfel încât $DP = PQ = QC$. Definem punctele R și S prin $2\overline{AR} = 3\overline{AP}$, respectiv $\overline{AS} = \overline{AB} + \overline{AR}$.
- Demonstrați că punctele A , C și S sunt coliniare.
 - Arătați că Q este centrul de greutate al triunghiului ARS .

Soluție.

a) $\overline{AS} = \overline{AB} + \overline{AR} = \overline{AB} + \frac{3}{2}\overline{AP} = \overline{AB} + \frac{3}{2}\left(\overline{AD} + \frac{1}{3}\overline{DC}\right) = \overline{AB} + \frac{3}{2}\overline{AD} + \frac{1}{2}\overline{AB} = \frac{3}{2}(\overline{AB} + \overline{AD}) = \frac{3}{2}\overline{AC}$,
 prin urmare punctele A , C și S sunt coliniare. 4 puncte

b) Dacă M este mijlocul lui RS , ar trebui să dovedim că $\overline{AQ} = \frac{2}{3}\overline{AM} = \frac{1}{3}(\overline{AR} + \overline{AS})$. Însă Q este mijlocul lui PC , prin urmare $\overline{AQ} = \frac{1}{2}(\overline{AP} + \overline{AC}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3}(\overline{AR} + \overline{AS})$, de unde concluzia problemei
 3 puncte

3. Se consideră numerele reale a, b și c astfel încât $a \leq b \leq c$, $a + b + c = 1$ și $a^2 + b^2 + c^2 = 1$.

a) Demonstrați că $b \in \left[0, \frac{2}{3}\right]$.

b) Găsiți trei numere reale, distincte două câte două, având proprietățile din enunț.

Soluție.

a) Dacă, prin absurd, $b < 0$, vom avea și $a < 0$. Rezultă că $c = 1 - a - b > 1$, prin urmare $a^2 + b^2 + c^2 > 0 + 0 + 1 = 1$, contradicție. 2 puncte

Dacă, prin absurd, $b > \frac{2}{3}$, vom avea și $c > \frac{2}{3}$. Rezultă că $a = 1 - b - c < -\frac{1}{3}$, prin urmare $a^2 + b^2 + c^2 > \frac{1}{9} + \frac{4}{9} + \frac{4}{9} = 1$, contradicție. 2 puncte

b) Considerăm, de exemplu, $b = \frac{1}{3}$. Obținem că $a + c = \frac{2}{3}$ și $a^2 + c^2 = \frac{8}{9}$; rezolvând prin metoda substituției acest sistem, obținem pentru a și c valorile $a = \frac{1 - \sqrt{3}}{3}$, $c = \frac{1 + \sqrt{3}}{3}$ 3 puncte

4. Pentru fiecare număr natural m , se consideră mulțimea $A_m = \{x \in \mathbb{Z} \mid |2x - 1| + |3x - 1| = m\}$.

a) Determinați A_0 .

b) Demonstrați că, oricare ar fi numărul natural m , mulțimea A_m are cel mult un element.

c) Dacă n este un număr întreg oarecare, arătați că există un număr natural m pentru care $n \in A_m$.

Soluție.


a) $A_0 = \emptyset$ 2 puncte

b) Dacă $x \leq 0$, ecuația ale cărei soluții constituie mulțimea A_m devine $5x = 2 - m$. Cum $x \in \mathbb{Z}$, soluția corespunzătoare este convenabilă dacă și numai dacă $m = 5n + 2, n \in \mathbb{N}$, caz în care $-n \in A_m$. Dacă $x \geq 1$, ecuația ale cărei soluții constituie mulțimea A_m devine $5x = 2 + m$. Cum $x \in \mathbb{Z}$, soluția corespunzătoare este convenabilă dacă și numai dacă $m = 5n + 3, n \in \mathbb{N}$, caz în care $n + 1 \in A_m$.

..... 3 puncte

Întrucât un număr nu poate da simultan restul 2 și restul 3 la împărțirea prin 5, rezultă că A_m este fie vidă, fie conține exact un element. 1 punct

c) Am observat că $-n \in A_{5n+2}$ și $n + 1 \in A_{5n+3}$, oricare ar fi numărul natural n , de unde cerința problemei 1 punct



INSPECTORATUL ȘCOLAR
JUDEȚEAN IAȘI

CONCURSUL NAȚIONAL DE MATEMATICĂ APLICATĂ "ADOLF HAIMOVICI"

ETAPA JUDEȚEANĂ
19 martie 2016



FACULTATEA
CONSTRUCȚII DE MAȘINI
ȘI MANAGEMENT INDUSTRIAL

Profil real, specializarea științele naturii

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE
CLASA A X-A

1. a) Demonstrați că $(29\sqrt{2} + 41) \cdot (29\sqrt{2} - 41) = 1$
 b) Calculați $(1 + \sqrt{2})^2$; $(1 + \sqrt{2})^3$ și $(1 + \sqrt{2})^5$
 c) Determinați $n \in \mathbb{N}^*$, $n \geq 2$ pentru care are loc egalitatea $\sqrt[n]{29\sqrt{2} + 41} - \sqrt[n]{29\sqrt{2} - 41} = 2$.

Soluție.

a) $(29\sqrt{2} + 41) \cdot (29\sqrt{2} - 41) = 1682 - 1681 = 1$ 1 punct

b) $(1 + \sqrt{2})^2 = 3 + 2\sqrt{2}$; $(1 + \sqrt{2})^3 = 7 + 5\sqrt{2}$; $(1 + \sqrt{2})^5 = 41 + 29\sqrt{2}$ 2 puncte

c) Notăm $\sqrt[n]{29\sqrt{2} + 41} = a$, $a > 0 \Rightarrow \sqrt[n]{29\sqrt{2} - 41} = \frac{1}{a}$ 1 punct

Ecuția devine $a - \frac{1}{a} = 2 \Rightarrow a^2 - 2a - 1 = 0$, cu soluțiile $a_{1,2} = 1 \pm \sqrt{2}$

Cum $a > 0 \Rightarrow a = 1 + \sqrt{2}$ 1 punct

$\sqrt[n]{29\sqrt{2} + 41} = 1 + \sqrt{2} \Rightarrow 29\sqrt{2} + 41 = (1 + \sqrt{2})^n \Rightarrow$ 1 punct

$(1 + \sqrt{2})^5 = (1 + \sqrt{2})^n \Rightarrow n = 5$ 1 punct

2. Rezolvați în \mathbb{R} ecuația $\log_2(x^2 + 4) - \log_2 x = 4x - x^2 - 2$.

Soluție.

Condițiile de existență, $x > 0$ 1 punct

$\log_2 \frac{x^2 + 4}{x} = 4x - x^2 - 2 \Rightarrow \log_2 \frac{x^2 + 4}{x} - 2 = 4x - x^2 - 4 \Rightarrow 2 - \log_2 \frac{x^2 + 4}{x} = x^2 - 4x - 4 \Rightarrow$

..... 2 puncte

$\log_2 4 - \log_2 \frac{x^2 + 4}{x} = x^2 - 4x + 4 \Rightarrow \log_2 4 - \log_2 \frac{x^2 + 4}{x} = (x - 2)^2 \Rightarrow \log_2 \frac{4x}{x^2 + 4} = (x - 2)^2$ (1)

..... 2 puncte

Observăm că $(x - 2)^2 \geq 0$, $\forall x > 0$, iar $\frac{4x}{x^2 + 4} \leq 1$, $\forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow \log_2 \frac{4x}{x^2 + 4} \leq \log_2 1 \Rightarrow \log_2 \frac{4x}{x^2 + 4} \leq 0$.

..... 1 punct

Egalitatea (1) nu poate avea loc decât dacă ambii membri sunt nuli:

$\frac{4x}{x^2 + 4} = 1$ și $(x - 2)^2 = 0 \Rightarrow x = 2$

..... 1 punct

3. Determinați mulțimea $M = \left\{ (x, y) \in \mathcal{P} \mid \operatorname{Re} \left(\frac{z-2}{z-4i} \right) = 0 \right\}$.

Reprezentați geometric mulțimea M . (unde $z = x + yi$, \mathcal{P} - planul complex)

Soluție.


$$\frac{z-2}{z-4i} = \frac{x+iy-2}{x+iy-4i} = \frac{x-2+iy}{x+i(y-4)} = \frac{x(x-2)+y(y-4)+ixy-i(y-4)(x-2)}{x^2+(y-4)^2} \dots\dots\dots 2 \text{ puncte}$$

$$\Rightarrow \operatorname{Re} \left(\frac{z-2}{z-4i} \right) = 0 \Leftrightarrow x(x-2)+y(y-4) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 2x + y^2 - 4y = 0 \dots\dots\dots 2 \text{ puncte}$$

$$\Leftrightarrow (x^2 - 2x + 1) + (y^2 - 4y + 4) = 5 \dots\dots\dots 1 \text{ punct}$$

$$(x-1)^2 + (y-2)^2 = 5 \Rightarrow M = \left\{ (x, y) \in \mathcal{P} \mid (x-1)^2 + (y-2)^2 = 5 \right\}. \dots\dots\dots 1 \text{ punct}$$

Imaginea geometrică a elementelor mulțimii M este cercul de centru $C(1,2)$ și rază $r = \sqrt{5}$.



..... 1 punct

4. La un turneu de fotbal în sală participă 15 echipe, fiecare jucând o singură dată cu fiecare dintre celelalte echipe. Pentru victorie se acordă echipei câștigătoare 3 puncte, pentru meci egal câte 2 puncte pentru fiecare echipă, iar pentru înfrângere 1 punct. În clasamentul întocmit la sfârșitul turneului nu există echipe cu același număr de puncte, iar echipa clasată pe ultimul loc are 21 puncte.

- a) Care este numărul de meciuri disputate în cadrul turneului ?
- b) Care este numărul total de puncte acordate la toate meciurile ?
- c) Să se demonstreze că prima clasată a făcut cel puțin un meci egal.

Soluție.

a) Fiecare echipă a disputat 14 meciuri. Numărul de meciuri disputate a fost $C_{15}^2 = \frac{15 \cdot 14}{2} = 105$
 1 punct


b) Cum la fiecare meci s-au acordat exact 4 puncte, deducem că numărul total de puncte acordate a fost $105 \cdot 4 = 420$ 1 punct

c) Cum ultima clasată are 21 puncte, iar în clasament nu sunt echipe cu același număr de puncte, rezultă că numărul total de puncte este cel puțin $21 + (21+1) + (21+2) + (21+3) + \dots + (21+14) =$
 $= 21 \cdot 15 + \frac{14 \cdot 15}{2} = 420$ 2 puncte

Din acest raționament deducem că echipele au punctajele: 21, 22, 23, ..., 35 1 punct

Presupunem că echipa situată pe primul loc nu a făcut nici un meci egal și notăm cu x numărul victoriilor și cu y numărul înfrângerilor 1 punct

Obținem: $\begin{cases} x + y = 14 \\ 3x + y = 35 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{21}{2} \notin \mathbb{N} \\ y = \frac{7}{2} \notin \mathbb{N} \end{cases} \dots\dots\dots 1 \text{ punct}$



INSPECTORATUL ȘCOLAR
JUDEȚEAN IAȘI

CONCURSUL NAȚIONAL DE MATEMATICĂ APLICATĂ "ADOLF HAIMOVICI"

ETAPA JUDEȚEANĂ
19 martie 2016



FACULTATEA
CONSTRUCȚII DE MAȘINI
ȘI MANAGEMENT INDUSTRIAL

Profil real, specializarea științele naturii

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE CLASA A XI-A

1. În fiecare din cele 9 căsuțe ale unei table de latură 3 este scrisă cifra 0.
Se alege un pătrat de latură 2 și se mărește numărul scris în fiecare din
cele 4 căsuțe cu o unitate.
Folosind repetat acest procedeu putem obține configurația alăturată ?
(Suma tuturor numerelor din configurație nu este multiplu de 4).

4	9	6
7	24	11
6	12	8

Soluție.

La fiecare alegere a unui pătrat 2×2 se mărește suma numerelor cu 4, așadar suma tuturor numerelor trebuie să fie multiplu de 4 4 puncte
În tabla dată suma numerelor nu este multiplu de 4, deci nu se poate ajunge la configurația cerută
..... 3puncte

2. Fie matricele $A = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ și $X(a) = I_2 + aA; a \in \mathbb{R}$. Demonstrați că $X(a)$ este inversabilă
dacă și numai dacă $a \neq -1$ și calculați $X^{-1}(1) \cdot X(2) \cdot X^{-1}(3) \cdot X(4) \cdot \dots \cdot X^{-1}(2013) \cdot X(2014)$.
(Meda Bujor, Supliment Gazeta Matematică – septembrie 2015)

Soluție.

$$\det X(a) = \begin{vmatrix} 1-a & -a \\ 2a & 1+2a \end{vmatrix} = 1+a \dots\dots\dots 2 \text{ puncte}$$

$$X(a) \text{ este inversabilă} \Leftrightarrow \det X(a) \neq 0 \Leftrightarrow a \neq -1 \dots\dots\dots 1 \text{ punct}$$

$$X^{-1}(a) = X\left(-\frac{a}{1+a}\right), \forall a \in \mathbb{R} \setminus \{-1\} \dots\dots\dots 1 \text{ punct}$$

$$X^{-1}(n) \cdot X(n+1) = X\left(\frac{1}{n+1}\right); \forall n \in \mathbb{N}^* \dots\dots\dots 1 \text{ punct}$$

$$X(a_1) \cdot X(a_2) \cdot X(a_3) \cdot \dots \cdot X(a_n) = X\left((1+a_1)(1+a_2)\dots(1+a_n)-1\right), \forall a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R} \dots\dots\dots 1 \text{ punct}$$

$$\text{Finalizare} \dots\dots\dots 1 \text{ punct}$$

3. Fie A, B, C puncte necoliniare în plan având coordonate întregi.

Să se arate că aria ΔABC este mai mare sau egală cu $\frac{1}{2}$.

Soluție.

$$\text{Aria } \Delta ABC = \frac{1}{2} \left| \begin{vmatrix} x_A & y_A & 1 \\ x_B & y_B & 1 \\ x_C & y_C & 1 \end{vmatrix} \right| \dots\dots\dots 3 \text{ puncte}$$

$$\left| \begin{vmatrix} x_A & y_A & 1 \\ x_B & y_B & 1 \\ x_C & y_C & 1 \end{vmatrix} \right| \in \mathbb{N}^* \dots\dots\dots 2 \text{ puncte}$$

$$\text{Aria } \Delta ABC \geq \frac{1}{2} \dots\dots\dots 2 \text{ puncte}$$

4. a) Precizați dacă următoarele afirmații sunt adevărate sau false:

i) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = 1$; ii) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x + \pi)}{x + \pi} = 1$. Justificare.


b) Să se calculeze raportul $\frac{a}{b}$ știind că $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{tg}(ax) - \sin(ax)}{\text{tg}(bx) - \sin(bx)} = 2016^3$.

Soluție.

a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = 0$ și $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x + \pi)}{x + \pi} = 0$. Așadar ambele afirmații sunt false 4 puncte

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{tg}(ax) - \sin(ax)}{\text{tg}(bx) - \sin(bx)} = \left(\frac{a}{b}\right)^3 \dots\dots\dots 2 \text{ puncte}$

Finalizare $\frac{a}{b} = 2016 \dots\dots\dots 1 \text{ punct}$



INSPECTORATUL ȘCOLAR
JUDEȚEAN IAȘI

CONCURSUL NAȚIONAL DE MATEMATICĂ APLICATĂ "ADOLF HAIMOVICI"

ETAPA JUDEȚEANĂ
19 martie 2016



FACULTATEA
CONSTRUCȚII DE MAȘINI
ȘI MANAGEMENT INDUSTRIAL

Profil real, specializarea științele naturii

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE CLASA A XII-A

1. Se consideră mulțimea $G = \left\{ A(k) = \begin{pmatrix} 2^k & 0 & 2^k \\ 0 & 0 & 0 \\ 2^k & 0 & 2^k \end{pmatrix}, k \in \mathbb{Z} \right\}$.

- a) Să se arate că pentru orice m, n întregi, are loc: $A(m) \cdot A(n) = A(m+n+1)$
- b) Să se demonstreze că (G, \cdot) este un grup abelian, unde “ \cdot ” reprezintă înmulțirea matricelor;
- c) Dacă mulțimea $H \neq \{A(-1)\}$ este un subgrup al grupului (G, \cdot) , să se demonstreze că H are cel puțin 2016 elemente.

Soluție.

a) $A(m) \cdot A(n) = \begin{pmatrix} 2^{m+n+1} & 0 & 2^{m+n+1} \\ 0 & 0 & 0 \\ 2^{m+n+1} & 0 & 2^{m+n+1} \end{pmatrix}$ 1 punct

- b) Element neutru $A(-1)$ 1 punct
- Verificarea celorlalte axiome 1 punct

- c) Dacă $H \neq \{A(-1)\}$ este un subgrup atunci exista $A(k)$ in H cu $k \in \mathbb{Z} - \{-1\}$ de unde rezultă
 $(A(k))^n$ este în H , pentru orice n număr natural nenul 1 punct
 $(A(k))^n = A(nk + n - 1)$ 1 punct
 $x_n = nk + n - 1$ este un șir strict crescător 1 punct
 H are cel puțin 2016 elemente 1 punct

2. Considerăm funcțiile $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 + e^x$ și $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $F(x) = \int_0^x f(t) dt$.

- a) Arătați că funcția F este bijectivă;

b) Calculați $\int_0^{e-\frac{2}{3}} F^{-1}(x) dx$.

Soluție.

- a) F bijectivă $\leftrightarrow F$ injectivă și F surjectivă 1 punct

$F(x)' = f(x) = x^2 + e^x > 0, \forall x \in \mathbb{R} \rightarrow F$ strict crescătoare, deci F injectivă 1 punct
 F continuă, deci F are proprietatea lui Darboux; $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = \infty; \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = -\infty$, deci F este surjectivă 1 punct

b) Facem substituția $x = F(t)$, de unde $dx = f(t)dt; x_1 = 0$ deci $t_1 = 0$ și $x_2 = e - \frac{2}{3}$ deci $t_2 = 1$
 2 puncte

$\int_0^{e-\frac{2}{3}} F^{-1}(x)dx = \int_0^1 tf'(t)dt = \frac{5}{4}$ 2 puncte

3. Pe mulțimea numerelor reale \mathbb{R} , definim legea de compoziție $x * y = xy + 5x + 5y + 20$. Se admite faptul că $G = (-5, \infty)$ împreună cu legea de compoziție "*" are o structură algebrică de grup.

- a) Să se arate că grupurile $(G, *)$ și (\mathbb{R}_+, \cdot) sunt izomorfe;
- b) Să se calculeze $-2016 * (-2015) * \dots * (-1) * 0 * 1 * \dots * 2015 * 2016$;
- c) Se consideră mulțimea $H = \{a^2 - 5, a \in \mathbb{Q}\}$. Să se arate că $(H, *)$ este un subgrup al grupului $(G, *)$.

Soluție.

- a) $f(x) = x + 5, f: (-5, \infty) \rightarrow (0, \infty)$ 2 puncte
- b) $-5 \in \mathbb{R}$ element absorbant, de unde $-2016 * (-2015) * \dots * (-1) * 0 * 1 * \dots * 2015 * 2016 = -5$
 2 puncte
- c) $x * y = (xy)^2 - 5 \in H$ 2 puncte
 $x^{-1} \in H$ 1 punct

4. Pentru orice n număr natural nenul, se consideră numerele $I_n = \int \frac{\sin(nx)}{\sin(x)} dx, \forall x \in (0, \pi)$.

- a) Să se demonstreze că $I_{n+2} = I_n + \frac{2\sin(n+1)x}{n+1}, \forall n \in \mathbb{N}^*$;
- b) Să se determine funcția $f: (0, \pi) \rightarrow \mathbb{R}$, știind că $f'(x) \cdot \sin x = \sin 5x$ și $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$

Soluție.

a) $I_{n+2} - I_n = \int \frac{\sin(n+2)x - \sin x}{\sin x} dx = 2 \int \cos(n+1)x dx = 2 \frac{\sin(n+1)x}{n+1} + C$
 3 puncte

b) $f'(x) = \frac{\sin 5x}{\sin x} \Rightarrow f(x) = I_5$
 1 punct

$I_5 = I_3 + \frac{2\sin 4x}{4} = I_1 + \frac{2\sin 2x}{2} + \frac{2\sin 4x}{4} = x + \sin 2x + \frac{\sin 4x}{2} + C$
 2 puncte

$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0 \Rightarrow C = -\frac{\pi}{2}$ 1 punct