INSPECTORATUL ȘCOLAR  
JUDEȚEAN IAȘICONCURSUL NAȚIONAL  
DE MATEMATICĂ APLICATĂ  
"ADOLF HAIMOVICI"ETAPA JUDEȚEANĂ  
10 martie 2018FACULTATEA  
CONSTRUCȚII DE MAȘINI  
ȘI MANAGEMENT INDUSTRIAL

Filiera tehnologică: profilul servicii, resurse naturale și protecția mediului

CLASA a IX-a

**Problema 1.**Considerăm progresia aritmetică  $(a_n)_{n \geq 1}$ ,  $a_n = 2n - 1$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$  și progresia geometrică  $(b_n)_{n \geq 1}$ ,  $b_n = 2^{2n-1}$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$ .

- Determinați  $n \in \mathbb{N}^*$  încât  $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = 2018^2$ .
- Demonstrați că rezultatul calculului  $b_{n+1} - 3(b_1 + b_2 + \dots + b_n)$  nu depinde de  $n \in \mathbb{N}^*$ .
- Demonstrați că pentru orice  $n \in \mathbb{N}^*$  are loc inegalitatea  $b_n \geq 1 + a_n$ .

**Problema 2.**Spunem că perechea de numere naturale nenule  $(m; n)$  este *interesantă* dacă  $0, (3) < \frac{m}{n} < 0,34$ .

- Stabiliți dacă perechea  $(330; 1000)$  este interesantă.
- Determinați valorile posibile ale lui  $n$  astfel încât perechea  $(330; n)$  să fie interesantă.
- Aflați câte perechi de numere interesante de forma  $(m; 1000)$  sunt.
- Determinați  $m$  și  $n$  astfel încât perechea  $(m; n)$  să fie interesantă și  $m$  să aibă valoare minimă.


**Problema 3.**Un atlet aleargă în jurul unui teren de formă dreptunghiulară  $ABCD$  cu lungimea de  $150m$  și lățimea de  $50m$ , pe traseul  $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow \dots$  și fără a-și schimba sensul de alergat.El pleacă din  $A$  cu zero puncte și de fiecare dată când ajunge într-unul din vârfurile  $B, C, D, A, B, C, \dots$  primește puncte după următoarea regulă: câte 1 punct în  $B$ ; câte 2 puncte în  $C$ ; câte 3 puncte în  $D$ ; câte 4 puncte în  $A$ .

- Aflați în ce punct s-a aflat atletul în momentul în care a înregistrat 53 de puncte.
- Determinați câți kilometri a parcurs atletul de la momentul plecării până când a înregistrat 53 de puncte.
- Aflați dacă atletul poate obține exact 2018 puncte.

**Problema 4.**Considerăm paralelogramul  $ABCD$  și punctele  $M \in (DC)$ ,  $N \in (BM)$  astfel încât  $DM = 3MC$  și  $BN = 4NM$ .

- Verificați că  $\overline{MC} = \frac{1}{4} \overline{AB}$ .
- Demonstrați că  $\overline{BM} = -\frac{1}{4} \overline{AB} + \overline{AD}$ .
- Exprimați vectorul  $\overline{AN}$  în funcție de vectorii  $\overline{AB}$  și  $\overline{AD}$ .
- Arătați că punctele  $A, N, C$  sunt coliniare și calculați valoarea raportului  $\frac{AN}{NC}$ .

**Notă:** Timp de lucru 4 ore; Toate subiectele sunt obligatorii; Fiecare subiect este notat cu punctaje de la 0 la 7.

INSPECTORATUL ȘCOLAR  
JUDEȚEAN IAȘICONCURSUL NAȚIONAL  
DE MATEMATICĂ APLICATĂ  
"ADOLF HAIMOVICI"ETAPA JUDEȚEANĂ  
10 martie 2018FACULTATEA  
CONSTRUCȚII DE MAȘINI  
ȘI MANAGEMENT INDUSTRIAL

Filiera tehnologică: profilul servicii, resurse naturale și protecția mediului

CLASA a X-a

**Problema 1.**Pentru fiecare  $x \in (0; +\infty)$ , considerăm numerele  $a_n(x) = (\sqrt{x})^{2^{1-n}} \cdot (\sqrt[3]{x})^n$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$ .

- Demonstrați că există  $n \in \mathbb{N}^*$  astfel încât  $a_n(x)$  nu depinde de  $x$ .
- Determinați  $n \in \mathbb{N}^*$  în cazul în care  $a_n(3) = 27$ .
- Determinați  $x \in (0; +\infty)$  în cazul în care  $a_{45}(x) = 3$ .
- Demonstrați că pentru o infinitate de valori  $x \in (0; +\infty)$  șirul  $a_n(x)$  are toți termenii numere raționale.

**Problema 2.**Pentru fiecare număr real  $a$  definim numărul  $z_a = \frac{a+i}{1+a \cdot i}$ , unde  $i^2 = -1$ .

- Demonstrați că  $|z_a| = 1$ , pentru orice  $a \in \mathbb{R}$ .
- Demonstrați că  $z_a \neq -i$ , pentru orice  $a \in \mathbb{R}$ .
- Determinați numerele reale  $a$  pentru care partea imaginară a numărului  $z_a$  este egală cu  $-\frac{4}{5}$ .
- Calculați produsul  $p = z_1 \cdot z_{\frac{1}{2}} \cdot z_{\frac{1}{3}} \cdot \dots \cdot z_{\frac{1}{2018}} \cdot z_1 \cdot z_2 \cdot z_3 \cdot \dots \cdot z_{2018}$ .

**Problema 3.**Fie numărul real  $a = \sqrt[3]{4+2\sqrt{2}} + \sqrt[3]{4-2\sqrt{2}}$ .

- Verificați  $a^3 - 6a - 8 = 0$ .
- Demonstrați că  $a \in (\sqrt{6}; 3)$ .
- Demonstrați că numărul  $x = \log_2(a^2 - 6) + \log_a\left(\frac{8}{a} + 6\right) + \log_{\frac{1}{2}}\frac{1}{a}$  este natural.

**Problema 4.**

Un program de calculator simulează o traiectorie curbă închisă, de lungime 15 cm și pe care două mobile pornesc din același punct dar în sensuri opuse, respectiv cu legile de deplasare date de funcțiile  $f(x) = x + 2^x - 1$  și  $g(x) = x + \log_2(x+1)$ , unde variabila  $x \geq 0$  reprezintă momentul măsurat în secunde iar  $f(x)$  și  $g(x)$  reprezintă distanța parcursă de cele două mobile de la momentul zero al deplasării până la momentul  $x \geq 0$ , măsurată în centimetri. Vom nota cu  $M$  mulțimea momentelor de întâlnire ale celor două mobile. Răspundeți la următoarele cerințe:

- Demonstrați că  $x \in M$  dacă și numai dacă  $(\exists) n \in \mathbb{N}^*$  astfel încât  $f(x) + g(x) = 15n$ .
- Determinați momentul primei întâlniri a celor două mobile.
- Demonstrați că  $x = 2^{68} - 1 \in M$ .

**Notă:** Timp de lucru 4 ore; Toate subiectele sunt obligatorii; Fiecare subiect este notat cu punctaje de la 0 la 7.



# CONCURSUL NAȚIONAL DE MATEMATICĂ APLICATĂ "ADOLF HAIMOVICI"



INSPECTORATUL ȘCOLAR  
JUDEȚEAN IAȘI

ETAPA JUDEȚEANĂ  
10 martie 2018

FACULTATEA  
CONSTRUCȚII DE MAȘINI  
ȘI MANAGEMENT INDUSTRIAL

Filiera tehnologică: profilul servicii, resurse naturale și protecția mediului

CLASA a XI-a

### Problema 1.

Fie matricea unitate  $I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$  și matricea  $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$ ,  $a \in \mathbb{R}$ .

- Calculați  $B = A - a \cdot I_3$ .
- Verificați  $B^2 = B + 2I_3$  și  $A^2 = (2a+1) \cdot A - (a^2 + a - 2) \cdot I_3$ .
- Demonstrați că  $A$  este inversabilă pentru orice  $a \in \mathbb{R} \setminus \{-2; 1\}$  și determinați  $A^{-1}$ .

### Problema 2.

Fie  $a, b, c \in \mathbb{R}$  și determinantul  $D(a, b, c) = \begin{vmatrix} a & a^2 & 1 \\ b & b^2 & 1 \\ c & c^2 & 1 \end{vmatrix}$ .

Totodată, în sistemul de coordonate  $(xOy)$ , considerăm punctele  $A_n(n; n^2)$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ .

- Demonstrați că  $D(a, b, c) = (b-a)(c-a)(c-b)$ .
- Demonstrați că pentru orice trei numere întregi distincte  $m, n, k$ , punctele  $A_m(m; m^2)$ ,  $A_n(n; n^2)$ ,  $A_k(k; k^2)$  sunt necoliniare și aria triunghiului  $A_m A_n A_k$  este număr natural.
- Demonstrați că aria triunghiului  $A_{n-2018} A_n A_{n+2018}$  nu depinde de  $n \in \mathbb{Z}$ .
- Demonstrați că nici unul din triunghiurile  $A_m A_n A_k$ , cu  $m, n, k \in \mathbb{Z}$ , nu are aria egală cu 2.

### Problema 3.

Două funcții  $f, g$  le numim *a-înrudite*,  $a \in \mathbb{R}$ , dacă există și este finită limita  $\lim_{x \rightarrow 1} [f(x) - a \cdot g(x)]$ .

- Demonstrați că funcțiile  $f(x) = \frac{x^3 - x^2 - 2x - 2}{x^2 - 1}$  și  $g(x) = \frac{x-2}{x-1}$  sunt 2-înrudite.
- Determinați  $a \in \mathbb{R}$  încât  $f(x) = \frac{\sqrt{4x+5}}{x^2-x}$  și  $g(x) = \frac{1}{(x-1)\sqrt{x}}$  să fie *a-înrudite*.
- Dacă alegem trei funcții  $f, g, h$  încât  $f$  și  $g$  sunt *a-înrudite* iar  $g$  și  $h$  sunt *b-înrudite*, demonstrați că atunci  $f$  și  $h$  sunt *ab-înrudite*.

### Problema 4.

Fie  $a, b, c \in \mathbb{R}$  încât funcția  $f(x) = \sqrt{x^2 + ax + b} + cx$  are domeniul maxim  $\mathbb{R}$  și  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1$ .

- Demonstrați că  $a = 2$ ,  $b \in [1; +\infty)$  și  $c = -1$ .
- Demonstrați că toate funcțiile cu această proprietate au aceleași asimptote.
- Arătați că nici una din funcțiile obținute nu este funcție rațională.

**Notă:** Timp de lucru 4 ore; Toate subiectele sunt obligatorii; Fiecare subiect este notat cu punctaje de la 0 la 7.

INSPECTORATUL ȘCOLAR  
JUDEȚEAN IAȘI**CONCURSUL NAȚIONAL  
DE MATEMATICĂ APLICATĂ  
"ADOLF HAIMOVICI"****ETAPA JUDEȚEANĂ  
10 martie 2018**FACULTATEA  
CONSTRUCȚII DE MAȘINI  
ȘI MANAGEMENT INDUSTRIAL**Filiera tehnologică: profilul servicii, resurse naturale și protecția mediului****CLASA a XII-a****Problema 1.**Considerăm structura algebrică  $(\mathbb{R}; \circ)$  cu legea de compoziție  $x \circ y = 3xy - 2x + y - 1$ ,  $(\forall) x, y \in \mathbb{R}$ .

- Demonstrați  $(\mathbb{R}; \circ)$  este structură neasociativă.
- Stabiliți dacă  $(\mathbb{R}; \circ)$  admite element neutru.
- Rezolvați în  $(\mathbb{R}; \circ)$  sistemul 
$$\begin{cases} (x-1) \circ y = 9 \\ (x+1) \circ (y-1) = 13 \end{cases}$$

**Problema 2.**Fie matricele  $X(a) = a \cdot A + I_2$ , cu  $a \in \mathbb{R}$ ,  $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -6 & 3 \end{pmatrix}$ ,  $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  și considerăm mulțimea  $G = \{X(a) / a > -1\}$ .

- Demonstrați că pentru orice  $a, b \in \mathbb{R}$  se verifică  $X(a) \cdot X(b) = X(a+b+ab)$ .
- Demonstrați că  $G$  împreună cu operația de înmulțire a matricelor este grup comutativ.
- Calculați produsul  $X\left(-\frac{1}{2}\right) \cdot X\left(-\frac{2}{3}\right) \cdot \dots \cdot X\left(-\frac{2017}{2018}\right) \cdot X(1) \cdot X(2) \cdot \dots \cdot X(2018)$ .


**Problema 3.**Considerăm funcția  $f: (0; +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$ .

- Calculați  $\int f(x) dx$ .
- Demonstrați că orice primitivă  $F$  a funcției  $f$  verifică  $F(2) < F(3)$ .
- Demonstrați că funcția  $g: (0; +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $g(x) = |f(x)|$ , admite primitive și determinați, din mulțimea primitivelor ei, cea primitivă  $G$  care verifică  $G(1) = 0$ .

**Problema 4.**

Rata de descreștere a unei populații de bacterii de pe o plantă, după  $t$  zile de la administrarea de insecticid, este dată de formula  $B'(t) = \frac{-3000}{(1+0,2t)^2}$ ,  $t \geq 0$ . Dacă numărul inițial al bacteriilor a fost de 8.000, aflați după câte zile numărul bacteriilor va fi cel mult egal cu 500.

**Notă:** Timp de lucru 4 ore; Toate subiectele sunt obligatorii; Fiecare subiect este notat cu punctaje de la 0 la 7.



INSPECTORATUL ȘCOLAR  
JUDEȚEAN IAȘI

CONCURSUL NAȚIONAL  
DE MATEMATICĂ APLICATĂ  
"ADOLF HAIMOVICI"

ETAPA JUDEȚEANĂ  
10 martie 2018



FACULTATEA  
CONSTRUCȚII DE MAȘINI  
ȘI MANAGEMENT INDUSTRIAL

Filiera tehnologică: profilul servicii, resurse naturale și protecția mediului

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE

Clasa a IX -a

**Problema 1.**

Considerăm progresia aritmetică  $(a_n)_{n \geq 1}$ ,  $a_n = 2n - 1$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$  și progresia geometrică  $(b_n)_{n \geq 1}$ ,  $b_n = 2^{2^{n-1}}$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$ .

- Determinați  $n \in \mathbb{N}^*$  încât  $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = 2018^2$ .
- Demonstrați că rezultatul calculului  $b_{n+1} - 3(b_1 + b_2 + \dots + b_n)$  nu depinde de  $n \in \mathbb{N}^*$ .
- Demonstrați că pentru orice  $n \in \mathbb{N}^*$  are loc inegalitatea  $b_n \geq 1 + a_n$ .

**SOLUȚIE:**

- $a_1 + a_2 + \dots + a_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = n^2$  ..... 2p  
 $n^2 = 2018^2 \Rightarrow n = 2018$  ..... 1p
- $b_1 + b_2 + \dots + b_n = b_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1} = 2 \cdot \frac{4^n - 1}{3}$  ..... 1p  
 $b_{n+1} - 3(b_1 + b_2 + \dots + b_n) = 2^{2^{n+1}} - 2 \cdot (4^n - 1) = 2$  ..... 1p
- Pentru  $n = 1$ ,  $b_1 \geq 1 + a_1 \Leftrightarrow 2 \geq 2$  și pentru ca inducția matematică să confirme inegalitatea  $b_n \geq 1 + a_n$  pentru orice  $n \geq 1$  avem de demonstrat implicația  $b_k \geq 1 + a_k \Rightarrow b_{k+1} \geq 1 + a_{k+1}$  ..... 1p  
 dar  $b_{k+1} = 4b_k \geq 4 \cdot (1 + a_k) = 8k \geq 2k + 2 = 1 + a_{k+1}$  ..... 1p

**Problema 2.**

Spunem că perechea de numere naturale nenule  $(m; n)$  este *interesantă* dacă  $0, (3) < \frac{m}{n} < 0,34$ .

- Stabiliți dacă perechea  $(330; 1000)$  este interesantă.
- Determinați valorile posibile ale lui  $n$  astfel încât perechea  $(330; n)$  să fie interesantă.
- Aflați câte perechi de numere interesante de forma  $(m; 1000)$  sunt.
- Determinați  $m$  și  $n$  astfel încât perechea  $(m; n)$  să fie interesantă și  $m$  să aibă valoare minimă.

**SOLUȚIE:**

- $\frac{m}{n} = \frac{330}{1000} = 0,33 < 0, (3)$ , contrazice  $0, (3) < \frac{m}{n}$ , deci  $(330; 1000)$  nu este interesantă ..... 1p

- b)  $m = 330 \Rightarrow \frac{1}{3} < \frac{330}{n} < \frac{34}{100}$  ..... 1p  
 $970, \dots < n < 990 \Rightarrow n \in \{971; 972; \dots; 989\}$  ..... 1p
- c)  $n = 1000, \frac{1}{3} < \frac{m}{1000} < \frac{34}{100}$  ..... 1p  
 $333 < m < 340 \Rightarrow m \in \{334; 335; \dots; 339\}$ , 6 soluții ..... 1p
- d)  $\frac{1}{3} < \frac{m}{n} < \frac{34}{100} \Leftrightarrow \frac{100m}{34} < n < 3m$  ..... 1p  
 cum  $n$  și  $3m$  sunt numere naturale, există  $n$  numai dacă  $\frac{100m}{34} < 3m - 1$ , deci  $m > 17$ ,  $m_{\min} = 18$   
 și atunci  $n = 53$  ..... 1p

### Problema 3.

Un atlet aleargă în jurul unui teren de formă dreptunghiulară  $ABCD$  cu lungimea de  $150m$  și lățimea de  $50m$ , pe traseul  $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow \dots$  și fără a-și schimba sensul de alergat.

El pleacă din  $A$  cu zero puncte și de fiecare dată când ajunge într-unul din vârfurile  $B, C, D, A, B, C, \dots$  primește puncte după următoarea regulă: câte 1 punct în  $B$ ; câte 2 puncte în  $C$ ; câte 3 puncte în  $D$ ; câte 4 puncte în  $A$ .

- Aflați în ce punct s-a aflat atletul în momentul în care a înregistrat 53 de puncte.
- Determinați câți kilometri a parcurs atletul de la momentul plecării până când a înregistrat 53 de puncte.
- Aflați dacă atletul poate obține exact 2018 puncte.

### SOLUȚIE:

- La prima parcurgere  $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$  atletul obține  $1+2+3=6$  puncte ..... 1p  
 și la fiecare parcurgere următoare  $D \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C$  obține câte  $4+1+2+3=10$  puncte ..... 1p  
 După 5 parcurgeri complete  $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$  obține 46 puncte și este în  $D$  ..... 1p  
 și continuând ajunge în  $A$  cu 50 puncte, în  $B$  cu 51 puncte, în  $C$  cu 53 puncte ..... 1p
- Atletul aleargă  $(5 \cdot P_{ABCD} + 200)m = 2,2Km$  ..... 1p
- Atletul poate obține puncte în una din variantele:  $10n; 10n+1; 10n+3; 10n+6$ ,  $n \in \mathbb{N}$  ..... 1p  
 și deoarece  $2018 = 2010 + 8$ , atletul nu poate înregistra 2018 puncte ..... 1p

### Problema 4.

Considerăm paralelogramul  $ABCD$  și punctele  $M \in (DC)$ ,  $N \in (BM)$  astfel încât  $DM = 3MC$  și  $BN = 4NM$ .

- Verificați că  $\overrightarrow{MC} = \frac{1}{4} \overrightarrow{AB}$ .
- Demonstrați că  $\overrightarrow{BM} = -\frac{1}{4} \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$ .
- Exprimați vectorul  $\overrightarrow{AN}$  în funcție de vectorii  $\overrightarrow{AB}$  și  $\overrightarrow{AD}$ .
- Demonstrați că punctele  $A, N, C$  sunt coliniare și calculați valoarea raportului  $\frac{AN}{NC}$ .

### SOLUȚIE:

- $\overrightarrow{MC}$  și  $\overrightarrow{AB}$  sunt coliniari și de același sens, deci  $\overrightarrow{MC} = \frac{MC}{AB} \cdot \overrightarrow{AB} = \frac{1}{4} \overrightarrow{AB}$  ..... 1p
- $\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CM} = \overrightarrow{AD} - \frac{1}{4} \overrightarrow{AB}$  ..... 2p
- $\overrightarrow{BN} = \frac{4}{5} \overrightarrow{BM} = \frac{4}{5} \overrightarrow{AD} - \frac{1}{5} \overrightarrow{AB}$  ..... 1p

$$\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BN} = \overrightarrow{AB} + \frac{4}{5}\overrightarrow{AD} - \frac{1}{5}\overrightarrow{AB} = \frac{4}{5}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) \dots\dots\dots 1p$$

d)  $\overrightarrow{AN} = \frac{4}{5}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) = \frac{4}{5}\overrightarrow{AC}$ , deci  $A, N, C$  sunt coliniare ..... 1p

$$\overrightarrow{AN} = \frac{4}{5}\overrightarrow{AC} \Rightarrow \overrightarrow{AN} = 4\overrightarrow{NC}, \text{ deci } \frac{AN}{NC} = 4 \dots\dots\dots 1p$$



**CONCURSUL NAȚIONAL  
DE MATEMATICĂ APLICATĂ  
"ADOLF HAIMOVICI"**



INSPECTORATUL ȘCOLAR  
JUDEȚEAN IAȘI

**ETAPA JUDEȚEANĂ  
10 martie 2018**

FACULTATEA  
CONSTRUCȚII DE MAȘINI  
ȘI MANAGEMENT INDUSTRIAL

**Filiera tehnologică: profilul servicii, resurse naturale și protecția mediului**

**BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE**

**Clasa a X -a**

**Problema 1.**

Pentru fiecare  $x \in (0; +\infty)$ , considerăm numerele  $a_n(x) = (\sqrt{x})^{21-n} \cdot (\sqrt[3]{x})^n$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$ .

- a) Demonstrați că există  $n \in \mathbb{N}^*$  astfel încât  $a_n(x)$  nu depinde de  $x$ .
- b) Determinați  $n \in \mathbb{N}^*$  în cazul în care  $a_n(3) = 27$ .
- c) Determinați  $x \in (0; +\infty)$  în cazul în care  $a_{45}(x) = 3$ .
- d) Demonstrați că, pentru o infinitate de valori  $x \in (0; +\infty)$ , toate numerele  $a_n(x)$  sunt raționale.

**SOLUȚIE:**

- a)  $a_n(x) = x^{\frac{21-n}{2}} \cdot x^{\frac{n}{3}} = x^{\frac{63-n}{6}}$  ..... 1p  
 pentru  $n = 63$ ,  $a_{63}(x) = 1$  nu depinde de  $x$  ..... 1p
- b)  $a_n(3) = 27 \Rightarrow \frac{63-n}{6} = 3 \Rightarrow n = 45$  ..... 2p
- c)  $a_{45}(x) = 3 \Rightarrow x^3 = 3 \Rightarrow x = \sqrt[3]{3}$  ..... 2p
- d) pentru  $x = 2^{6k}$ ,  $(\forall) k \in \mathbb{Z}$ ,  $\Rightarrow a_n(x) \in \mathbb{Q}$  ..... 1p

**Problema 2.**

Pentru fiecare număr real  $a$  definim numărul  $z_a = \frac{a+i}{1+a \cdot i}$ , unde  $i^2 = -1$ .

- a) Demonstrați că  $|z_a| = 1$ , pentru orice  $a \in \mathbb{R}$ .
- b) Demonstrați că  $z_a \neq -i$ , pentru orice  $a \in \mathbb{R}$ .
- c) Determinați numerele reale  $a$  pentru care partea imaginară a numărului  $z_a$  este egală cu  $-\frac{4}{5}$ .
- d) Calculați produsul  $p = z_1 \cdot z_{\frac{1}{2}} \cdot z_{\frac{1}{3}} \cdot \dots \cdot z_{\frac{1}{2018}} \cdot z_1 \cdot z_2 \cdot z_3 \cdot \dots \cdot z_{2018}$

**SOLUȚIE:**

- a)  $|z_a| = \frac{\sqrt{a^2+1}}{\sqrt{1+a^2}} = 1$  ..... 2p
- b)  $z_a = -i \Rightarrow a+i = -i+a$ , fals ..... 1p



- c)  $z_a = \frac{2a}{1+a^2} + \frac{1-a^2}{1+a^2} \cdot i$  ..... 1p  
 $\frac{1-a^2}{1+a^2} = -\frac{4}{5} \Rightarrow a = -3$  sau  $a = 3$  ..... 1p
- d) Observăm că  $z_{\frac{1}{a}} = \frac{1+ai}{a+i} = \frac{1}{z_a}$ , deci  $z_{\frac{1}{a}} \cdot z_a = 1$ ,  $(\forall) a \in \mathbb{R}^*$  ..... 1p  
 $\Rightarrow p = 1$  ..... 1p

**Problema 3.**

Fie numărul real  $a = \sqrt[3]{4+2\sqrt{2}} + \sqrt[3]{4-2\sqrt{2}}$ .

- a) Verificați  $a^3 - 6a - 8 = 0$ .  
b) Demonstrați că  $a \in (\sqrt{6}; 3)$ .  
c) Demonstrați că numărul  $x = \log_2(a^2 - 6) + \log_a\left(\frac{8}{a} + 6\right) + \log_{\frac{1}{2}}\frac{1}{a}$  este natural.

**SOLUȚIE:**

- a)  $a^3 = 4 + 2\sqrt{2} + 4 - 2\sqrt{2} + 3\sqrt[3]{(4+2\sqrt{2})(4-2\sqrt{2})}(\sqrt[3]{4+2\sqrt{2}} + \sqrt[3]{4-2\sqrt{2}}) = 8 + 6a$  ..... 2p  
b) Evident,  $a > 0$  și din  $8 = a(a^2 - 6) \Rightarrow a > \sqrt{6}$  ..... 1p  
Dacă  $a \geq 3$ , atunci  $8 = a(a^2 - 6) \geq 9$ , fals ..... 1p  
c)  $x = \log_2\frac{8}{a} + \log_a a^2 + \log_2 a$  ..... 1p  
 $x = \log_2\left(\frac{8}{a} \cdot a\right) + 2$  ..... 1p  
 $x = 5$  ..... 1p

**Problema 4.**

Un program de calculator simulează o traiectorie curbă închisă, de lungime 15cm și pe care două mobile pornesc din același punct dar în sensuri opuse, respectiv cu legile de deplasare date de funcțiile  $f(x) = x + 2^x - 1$  și  $g(x) = x + \log_2(x+1)$ , unde variabila  $x \geq 0$  reprezintă momentul măsurat în secunde iar  $f(x)$  și  $g(x)$  reprezintă distanța parcursă de cele două mobile de la momentul zero al deplasării până la momentul  $x \geq 0$ , măsurată în centimetri. Vom nota cu  $M$  mulțimea momentelor de întâlnire ale celor două mobile. Răspundeți la următoarele cerințe:

- a) Demonstrați că  $x \in M$  dacă și numai dacă  $(\exists)n \in \mathbb{N}^*$  astfel încât  $f(x) + g(x) = 15n$ .  
b) Determinați momentul primei întâlniri a celor două mobile.  
c) Demonstrați că  $x = 2^{68} - 1 \in M$ .

**SOLUȚIE:**

- a) Considerând  $h: [0; +\infty)$ ,  $h(x) = f(x) + g(x)$   
 $\Rightarrow h(x) = 2x + 2^x + \log_2(x+1) - 1$  este funcție strict crescătoare, cu  $h(0) = 0$  ..... 1p  
 $\Rightarrow$  cum lungimea traseului este de 15cm și cele două mobile se deplasează pe traiectorie în sensuri opuse, are loc întâlnirea în fiecare moment  $x > 0$  în care  $h(x) = 15n$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$  ..... 1p
- b) Cum  $h(x) = f(x) + g(x)$  este strict crescătoare, cu  $h(0) = 0$ , prima întâlnire are loc la unicul moment  $x > 0$  în care se verifică  $h(x) = 15$  ..... 1p  
Folosind monotonia, se caută și se găsește  $h(3) = 15$ , deci  $x = 3$  este momentul primei întâlniri ..... 1p

c)  $x = 2^{68} - 1 \in M \Leftrightarrow h(2^{68} - 1) = 15n$ , cu  $n \in \mathbb{N}^*$  ..... 1p

$h(2^{68} - 1) = 2(2^{68} - 1) + 2^{2^{68}-1} + 67$ , din care  $h(2^{68} - 1) = 2(16^{17} - 1) + 8(16^{(2^{66}-1)} - 1) + 75$  ..... 1p

dar  $(16^k - 1) : 15 \ (\forall) k \in \mathbb{N}$  și implicit  $h(2^{68} - 1) : 15$  ..... 1p



INSPECTORATUL ȘCOLAR  
JUDEȚEAN IAȘI

# CONCURSUL NAȚIONAL DE MATEMATICĂ APLICATĂ "ADOLF HAIMOVICI"

ETAPA JUDEȚEANĂ  
10 martie 2018



FACULTATEA  
CONSTRUCȚII DE MAȘINI  
ȘI MANAGEMENT INDUSTRIAL

Filiera tehnologică: profilul servicii, resurse naturale și protecția mediului

## BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE

Clasa a XI -a

### Problema 1.

Fie matricea unitate  $I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$  și matricea  $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$ ,  $a \in \mathbb{R}$ .

- a) Calculați  $B = A - a \cdot I_3$ .
- b) Verificați  $B^2 = B + 2I_3$  și  $A^2 = (2a+1) \cdot A - (a^2 + a - 2) \cdot I_3$ .
- c) Demonstrați că  $A$  este inversabilă pentru orice  $a \in \mathbb{R} \setminus \{-2; 1\}$  și determinați  $A^{-1}$ .

### SOLUȚIE:

a)  $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$  ..... 1p

b)  $B^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} = B + 2I_3$  ..... 1p

$A^2 = (aI_3 + B)^2 = a^2I_3 + 2aB + B^2 = a^2I_3 + 2a(A - aI_3) + (A - aI_3)^2 =$  ..... 1p

$\dots = (2a+1) \cdot A - (a^2 + a - 2) \cdot I_3$  ..... 1p

c)  $\det A = \begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix} = \dots = (a+2)(a-1)^2$  ..... 1p

$\det A \neq 0 \Leftrightarrow a \notin \{-2; 1\}$  ..... 1p

Cum  $A^2 = (2a+1) \cdot A - (a^2 + a - 2) \cdot I_3$ ,  $A^{-1} = \frac{2a+1}{a^2 + a - 2} \cdot I_3 - \frac{1}{a^2 + a - 2} \cdot A$  ..... 1p

**Problema 2.**

Fie  $a, b, c \in \mathbb{R}$  și determinantul  $D(a, b, c) = \begin{vmatrix} a & a^2 & 1 \\ b & b^2 & 1 \\ c & c^2 & 1 \end{vmatrix}$ .

Totodată, în sistemul de coordonate  $(xOy)$ , considerăm punctele  $A_n(n; n^2)$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ .

- Demonstrați că  $D(a, b, c) = (b-a)(c-a)(c-b)$ .
- Demonstrați că pentru orice trei numere întregi distincte  $m, n, k$ , punctele  $A_m(m; m^2)$ ,  $A_n(n; n^2)$ ,  $A_k(k; k^2)$  sunt necoliniare și aria triunghiului  $A_m A_n A_k$  este număr natural.
- Demonstrați că aria triunghiului  $A_{n-2018} A_n A_{n+2018}$  nu depinde de  $n \in \mathbb{Z}$ .
- Demonstrați că nici unul din triunghiurile  $A_m A_n A_k$ , cu  $m, n, k \in \mathbb{Z}$ , nu are aria egală cu 2.

**SOLUȚIE:**

- Verificare  $D(a, b, c) = \dots = (b-a)(c-a)(c-b)$  ..... 2p
- $S(A_m A_n A_k) = \frac{1}{2} |D(m; n; k)| = \frac{1}{2} |(m-n)(m-k)(n-k)| \in \mathbb{N}$  deoarece din cele trei numere  $m, n, k \in \mathbb{Z}$ , două au aceeași paritate și astfel diferența lor este număr par, deci  $|(m-n)(m-k)(n-k)| : 2$  ..... 2p
- $A_{n-2018} A_n A_{n+2018} = \dots = 2018^3$  care nu depinde de  $n \in \mathbb{Z}$  ..... 2p
- Fără a afecta generalitatea, putem considera  $m > n > k$  și atunci, în ipoteza  $S(A_m A_n A_k) = 2$ , am avea  $(m-n)(m-k)(n-k) = 4$ . Cum  $m, n, k \in \mathbb{Z}$  sunt distincte  $\Rightarrow m-k > m-n \geq 1$  și  $m-k > n-k \geq 1$ , rezultând  $m-k = 4$  și  $m-n = n-k = 1$ , imposibil ..... 1p

**Problema 3.**

Două funcții  $f, g$  le numim *a-înrudite*,  $a \in \mathbb{R}$ , dacă există și este finită limita  $\lim_{x \rightarrow 1} [f(x) - a \cdot g(x)]$ .

- Demonstrați că funcțiile  $f(x) = \frac{x^3 - x^2 - 2x - 2}{x^2 - 1}$  și  $g(x) = \frac{x-2}{x-1}$  sunt *2-înrudite*.
- Determinați  $a \in \mathbb{R}$  încât  $f(x) = \frac{\sqrt{4x+5}}{x^2-x}$  și  $g(x) = \frac{1}{(x-1)\sqrt{x}}$  să fie *a-înrudite*.
- Dacă alegem trei funcții  $f, g, h$  încât  $f$  și  $g$  sunt *a-înrudite* iar  $g$  și  $h$  sunt *b-înrudite*, demonstrați că atunci  $f$  și  $h$  sunt *ab-înrudite*.

**SOLUȚIE:**

- $\lim_{x \rightarrow 1} [f(x) - 2g(x)] = \lim_{x \rightarrow 1} \left( \frac{x^3 - x^2 - 2x - 2}{x^2 - 1} - \frac{2x - 4}{x - 1} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 3x^2 + 2}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x^2 - 2x - 2)}{(x-1)(x+1)} = -\frac{3}{2}$  ..... 2p
- $\lim_{x \rightarrow 1} [f(x) - a \cdot g(x)] = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{4x+5} - a\sqrt{x}}{(x-1) \cdot x}$  este finită  $\Leftrightarrow a = 3$  ..... 1p  
 $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} [f(x) - a \cdot g(x)] = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{5 - 5x}{(x-1) \cdot x(\sqrt{4x+5} + 3\sqrt{x})} = \dots = -\frac{5}{6}$  ..... 2p
- $f(x) - ab \cdot h(x) = f(x) - a \cdot g(x) + a[g(x) - b \cdot h(x)]$  ..... 1p  
 deci  $\lim_{x \rightarrow 1} [f(x) - ab \cdot h(x)]$  există și este finită ..... 1p

**Problema 4.**

Fie  $a, b, c \in \mathbb{R}$  încât funcția  $f(x) = \sqrt{x^2 + ax + b} + cx$  are domeniul maxim  $\mathbb{R}$  și  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1$ .

- Demonstrați că  $a = 2$ ,  $b \in [1; +\infty)$  și  $c = -1$ .
- Demonstrați că toate funcțiile cu această proprietate au aceleași asimptote.
- Demonstrați că nici una din funcțiile obținute nu este funcție rațională.

**SOLUȚIE:**

a)  $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + ax + b} + cx) = 1$  obligă  $c = -1$ , în caz contrar limita fiind infinită ..... 1p

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + ax + b} - x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{ax + b}{\sqrt{x^2 + ax + b} + x} = \frac{a}{2} = 1 \Rightarrow a = 2 \dots\dots\dots 1p$$

din  $x^2 + ax + b \geq 0$ ,  $(\forall)x \in \mathbb{R} \Rightarrow b \in [1; +\infty)$  ..... 1p

b)  $f(x) = \sqrt{x^2 + 2x + b} - x$ ,  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , fiind elementară, este continuă pe domeniul ei de definiție, deci nu are asimptote verticale și cum  $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 2x + b} - x) = 1$ , are la  $+\infty$  asimptotă orizontală  $y = 1$  ..... 1p

Cum  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + 2x + b} - x) = +\infty$ ,  $f$  nu are asimptotă orizontală spre  $-\infty$ .

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 2x + b} - x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 - 2x + b} + x}{-x} = -2 \Rightarrow m = -2 \dots\dots\dots 1p$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - mx) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + 2x + b} + x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 - 2x + b} - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2x + b}{\sqrt{x^2 - 2x + b} + x} = -1$$

$\Rightarrow y = -2x - 1$  asimptotă oblică spre  $-\infty$  ..... 1p

c) Dacă  $f(x) = \sqrt{x^2 + 2x + b} - x$ ,  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  ar fi funcție rațională, atunci asimptota spre  $+\infty$ ,  $y = 1$ , ar fi și asimptotă spre  $-\infty$ , contradicție cu  $y = -2x - 1$  asimptotă oblică spre  $-\infty$  ..... 1p



INSPECTORATUL ȘCOLAR  
JUDEȚEAN IAȘI

CONCURSUL NAȚIONAL  
DE MATEMATICĂ APLICATĂ  
"ADOLF HAIMOVICI"

ETAPA JUDEȚEANĂ  
10 martie 2018



FACULTATEA  
CONSTRUCȚII DE MAȘINI  
ȘI MANAGEMENT INDUSTRIAL

Filiera tehnologică: profilul servicii, resurse naturale și protecția mediului

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE

Clasa a XII -a

**Problema 1.**

Considerăm structura algebrică  $(\mathbb{R}; \circ)$  cu legea de compoziție  $x \circ y = 3xy - 2x + y - 1$ ,  $(\forall) x, y \in \mathbb{R}$ .

- Demonstrați  $(\mathbb{R}; \circ)$  este structură neasociativă.
- Stabiliți dacă  $(\mathbb{R}; \circ)$  admite element neutru.
- Rezolvați în  $(\mathbb{R}; \circ)$  sistemul 
$$\begin{cases} (x-1) \circ y = 9 \\ (x+1) \circ (y-1) = 13 \end{cases}$$

**SOLUȚIE:**

- Structura este neasociativă dacă are loc  $(x \circ y) \circ z \neq x \circ (y \circ z)$ , măcar într-o situație particulară ..... 1p  
Verificare particulară, spre exemplu  $(0 \circ 1) \circ 2 \neq 0 \circ (1 \circ 2)$  ..... 1p
- Dacă  $e \in \mathbb{R}$  este element neutru,  $x \circ e = e \circ x = x$ ,  $(\forall) x \in \mathbb{R}$  și atunci  
 $x \circ e = x$ ,  $(\forall) x \in \mathbb{R} \Rightarrow e = 1$  ..... 1p  
 $e \circ x = x$ ,  $(\forall) x \in \mathbb{R} \Rightarrow 3ex - 2e + x - 1 = x$ ,  $(\forall) x \in \mathbb{R}$  și împreună cu  $e = 1 \Rightarrow$   
 $\Rightarrow x = 1$   $(\forall) x \in \mathbb{R}$  (!!!) contradicție, deci  $(\mathbb{R}; \circ)$  nu admite element neutru. .... 1p
- $(x-1) \circ y = 9 \Leftrightarrow 3xy - 2y - 2x = 8$  ..... 1p  
 $(x-1) \circ (y-1) = 9 \Leftrightarrow 3xy + 4y - 5x = 20$  ..... 1p  
Soluții  $(x; y) = (2; 3)$  și  $(x; y) = (-4; 0)$  ..... 1p

**Problema 2.**

Fie matricele  $X(a) = a \cdot A + I_2$ , cu  $a \in \mathbb{R}$ ,  $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -6 & 3 \end{pmatrix}$ ,  $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  și considerăm mulțimea  $G = \{X(a) / a > -1\}$ .

- Demonstrați că pentru orice  $a, b \in \mathbb{R}$  se verifică  $X(a) \cdot X(b) = X(a+b+ab)$ .
- Demonstrați că  $G$  împreună cu operația de înmulțire a matricelor este grup comutativ.
- Calculați produsul  $X\left(-\frac{1}{2}\right) \cdot X\left(-\frac{2}{3}\right) \cdot \dots \cdot X\left(-\frac{2017}{2018}\right) \cdot X(1) \cdot X(2) \cdot \dots \cdot X(2018)$ .

**SOLUȚIE:**

- a)  $X(a) \cdot X(b) = (I_2 + aA)(I_2 + bA) = I_2 + (a+b)A + abA^2$ , dar  $A^2 = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -6 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -6 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -6 & 3 \end{pmatrix} = A$  și se confirmă  $X(a) \cdot X(b) = X(a+b+ab)$  ..... 1p
- b) Înmulțirea matricelor este lege de compoziție pe  $G$ , deoarece din  $a > -1$  și  $b > -1$  se obține  $(a+1)(b+1) > 0$ , din care  $a+b+ab > -1$  ..... 1p  
 Înmulțirea matricelor din  $M_2(\mathbb{R})$  este asociativă iar  $X(a) \cdot X(b) = X(a+b+ab)$  arată că în  $G$  înmulțirea este și comutativă ..... 1p  
 $I_2 = X(0) \in G$  este element neutru ..... 1p  
 pentru  $a > -1$ ,  $[X(a)]^{-1} = X\left(\frac{-a}{a+1}\right) \in G$  ..... 1p
- c) Cum  $X(a) \cdot X\left(\frac{-a}{a+1}\right) = I_2$ , folosind comutativitatea și asociativitatea, produsul devine ..... 1p  
 $\left[X(1) \cdot X\left(-\frac{1}{2}\right)\right] \cdot \left[X(2) \cdot X\left(-\frac{2}{3}\right)\right] \cdot \dots \cdot \left[X(2017) \cdot X\left(-\frac{2017}{2018}\right)\right] \cdot X(2018) = X(2018)$  ..... 1p

**Problema 3.**

Considerăm funcția  $f : (0; +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$ .

- a) Calculați  $\int f(x) dx$ .
- b) Demonstrați că orice primitivă  $F$  a funcției  $f$  verifică  $F(2) < F(3)$ .
- c) Demonstrați că funcția  $g : (0; +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $g(x) = |f(x)|$ , admite primitive și determinați, din mulțimea primitivelor ei, acea primitivă  $G$  care verifică  $G(1) = 0$ .

**SOLUȚIE:**

- a)  $\int \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx = 2\sqrt{x}(\ln x - 2) + C$  ..... 3p
- b)  $F'(x) = f(x) = \frac{\ln x}{\sqrt{x}} > 0$  pentru  $x > 1$ , deci  $F$  este crescătoare pe  $(1; +\infty)$  ..... 1p  
 și astfel  $F(2) < F(3)$  ..... 1p
- c)  $g(x) = \begin{cases} -\frac{\ln x}{\sqrt{x}}, & x \in (0; 1) \\ \frac{\ln x}{\sqrt{x}}, & x \in [1; +\infty) \end{cases} \Rightarrow G(x) = \begin{cases} -2\sqrt{x}(\ln x - 2) + C_1, & x \in (0; 1) \\ 2\sqrt{x}(\ln x - 2) + C_2, & x \in [1; +\infty) \end{cases}$  ..... 1p  
 $G$  derivabilă,  $G(1) = 0 \Rightarrow C_1 = -4, C_2 = 4$  ..... 1p

**Problema 4.**

Rata de descreștere a unei populații de bacterii de pe o plantă, după  $t$  zile de la administrarea de insecticid, este dată de formula  $B'(t) = \frac{-3000}{(1+0,2t)^2}$ ,  $t \geq 0$ . Dacă numărul inițial al bacteriilor a fost de 8.000, aflați după câte zile numărul bacteriilor va fi cel mult egal cu 500.

**SOLUȚIE:**

a)  $B(t) = -3000 \cdot \int \frac{1}{(1+0,2t)^2} dt \dots\dots\dots 2p$

$B(t) = -\frac{3000}{0,2} \cdot \int \frac{0,2}{(1+0,2t)^2} dt = \frac{15.000}{1+0,2t} + C \dots\dots\dots 2p$

$t=0 \Rightarrow B(0) = 15000 + C = 8000 \Rightarrow C = -7000 \dots\dots\dots 1p$

$B(t) = \frac{15.000}{1+0,2t} - 7000 \leq 500 \dots\dots\dots 1p$

din care  $t \geq 5 \dots\dots\dots 1p$